

VIII. Anexos

Anexo 1. Indicadores actuales

En la siguiente tabla se muestran los datos de los indicadores epidemiológicos para la vigilancia de la TB en los últimos cinco años, incluidos en el último informe del CNE con los datos de la RENAVE y los propuestos en este documento obtenidos con los datos de la RENAVE.

INDICADORES	2007	2008	2009	2010	2011
Incidencia TB respiratoria	14,20	14,24	12,91	11,71	10,96
Incidencia meningitis TB	0,24	0,20	0,23	0,22	0,22
Incidencia otras TB	3,49	3,58	3,67	3,78	3,56
Tasa de notificación de casos	17,93	18,02	16,81	15,71	14,86
Incidencia niños	7,61	9,20	8,00	7,13	7,87
Incidencia adultos	19,61	19,46	18,34	17,23	15,96
Razón de tasas niños/adultos	0,39	0,47	0,44	0,41	0,49
Edad media de casos (años)	42,26	41,06	41,67	43,47	43,46
Incidencia media TB UE/AEE	16,80	16,50	15,80	14,60	14,20
Proporción anual de casos con TB pulmonar con baciloscopia de esputo + donde se ha realizado estudio de contactos ¹	79	82	87	87	89
Tasa de éxito del tratamiento	nd ²	nd ²	nd ²	72	75,71
Proporción de nuevos casos pulmonares confirmados por cultivo en adultos	67,1	66,7	66,6	79,3	81,26
Porcentaje de casos de TB pulmonar en adultos (≥15 años) confirmados por cultivo que tienen realizado el antibiograma a fármacos de primera línea ³	82	87	88	91	93,40
Porcentaje de pacientes con TB de los que se conoce su estatus VIH	47	48	52	68	68
Porcentaje de cumplimentación de variables					
Edad	99,60	99,50	99,90	100	99,90
Sexo	99,70	99,90	99	100	99,90
Localización 3 categorías	100	100	100	100	100
Localización fundamental o localización 10 categorías	37	44	45	50	54
País de origen (España/fuera)	93	97	99	99	99,44
Tipo de caso según antecedente de tratamiento previo	85	90	94	95	95,87
Resultados de baciloscopia	69	73	74	88	90,27

Resultados de cultivo	66	68	70	84	87,37
Presencia de anticuerpos (estatus) VIH	47	48	52	68	68
Resultados de tratamiento	43	45	59	78	84,12
Clasificación de caso	94,60	99,60	99,99	99,70	99,60
Fecha de inicio de tratamiento	61,50	64,90	81,70	95,10	94,90
Localización adicional ⁴	8	8	8	9	12
Identificación de microorganismo ⁵	70	66	71	72	68
Antibiograma (SI/NO) ⁶	60	63	63	67	64,16
Resistencia a alguno de los 5 fármacos de primera línea (SI/NO) ⁷	58	61	61	64	63
Estudio de contactos realizado (SI/NO) ⁸	94	95	93	92	83,87

¹ Variable estudio de contactos no es obligatoria. Los datos corresponden a Cataluña.

² nd: dato no disponible.

³ Variable antibiograma no es obligatoria. Los datos corresponden a Cataluña.

⁴ Calculado sobre las CCAA que declaran esta variable. En 2007 las CCAA que declararon son Cantabria, Cataluña, C. Madrid, Región de Murcia y la ciudad de Melilla; en 2008, 2009 y 2010 declararon Cantabria, Castilla y León, Cataluña, C. Madrid, Región de Murcia y La Rioja; y en el año 2011, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, C. Madrid, Región de Murcia, La Rioja, y las ciudades de Ceuta y Melilla.

⁵ Calculado sobre las CCAA que declaran esta variable. En los años 2007 y 2008 las CCAA que declararon son Cataluña, C. Madrid, Región de Murcia y la ciudad de Melilla; en 2009 declararon Cataluña, C. Madrid y Región de Murcia; en 2010 declararon Cataluña, C. Madrid, Región de Murcia y las ciudades de Ceuta y Melilla; y en el año 2011, Cataluña, C. Madrid, Región de Murcia y la ciudad de Melilla.

⁶ Variable antibiograma no es obligatoria. Los datos corresponden a Cataluña.

⁷ Variable resistencias no es obligatoria. Los datos corresponden a Cataluña.

⁸ Variable estudio de contactos no es obligatoria. Los datos corresponden a Cataluña.