

VI. Otros indicadores para inclusión posterior

A continuación se detallan unos cuantos indicadores más que podrían recogerse teniendo en cuenta la evaluación de otros de los compromisos adquiridos en el Plan.

Tiempo de demora entre el inicio de síntomas y el inicio de tratamiento de los casos de TB pulmonar

Este indicador podría ser de utilidad para la medición del compromiso del Plan de “reducir el retraso diagnóstico a menos de un mes”.

Mediana de tiempo existente entre la fecha de inicio de síntomas y la fecha inicio de tratamiento de los casos declarados de TB pulmonar en el año (en días).

Puede ser obtenido de los datos notificados a la RENAVE.

Se realizará una medición anual.

— **Objetivo nacional:** Mediana de la demora inferior a 30 días.

Tasa de abandono del tratamiento

Este indicador es de utilidad para valorar la calidad del seguimiento terapéutico del paciente y de re-tratamientos en un periodo de tiempo. Uno de los objetivos del Plan es el de “realizar el seguimiento de los resultados a los 12 meses del inicio del tratamiento” que podría ser medido con este indicador.

$$\frac{\text{Número de casos de TB confirmados por cultivo en un año que interrumpen el tratamiento durante más de 2 meses consecutivos}}{\text{Número total de casos de TB confirmados por cultivo declarados en ese año}} \times 100$$

El numerador y el denominador pueden ser obtenidos de los datos notificados a la RENAVE.

Se realizará una medición anual.

— **Objetivo nacional:** La tasa de abandono del tratamiento será <5%.

Tasa de notificación de casos de TB-MDR

Este es un indicador del ECDC, que proporciona información sobre el número de casos de TB-MDR por 100.000 habitantes, a la vez que la sensibilidad a fármacos.

Medirá los compromisos del Plan: “Se deberán recoger las siguientes variables específicas: resistente a alguno de los cinco fármacos de primera línea” y “se considera necesaria la recogida sistemática a nivel nacional de los resultados de las pruebas de sensibilidad a fármacos antituberculosos para todas las cepas aisladas de los casos de TB, tanto sensibles como resistentes.”

Número de casos de TB-MDR declarados en el año

x100

Número de casos de TB con antibiograma declarados en el año

El numerador es el número de nuevos casos de TB-MDR notificados por año, que puede ser obtenido de los datos de la RENAVE. El denominador, número de casos de TB con antibiograma declarados en el año, también puede ser obtenido de los datos de la RENAVE.

Se realizará una medición anualmente.

- **Objetivo ECDC:** Tendencia decreciente de la tasa de notificación de casos en los últimos cinco años.
- **Objetivo nacional:** Tendencia decreciente de la tasa de notificación de casos.

Tasa de notificación de casos de TB resistentes a isoniazida

Medirá los compromisos del Plan: “Se deberán recoger las siguientes variables específicas: ...resistente a alguno de los cinco fármacos de primera línea” y “se considera necesaria la recogida sistemática a nivel nacional de los resultados de las pruebas de sensibilidad a fármacos antituberculosos para todas las cepas aisladas de los casos de TB, tanto sensibles como resistentes.”

Número de casos de TB resistentes a isoniazida en el año

x100

Número de casos de TB con antibiograma declarados en el año

El numerador y el denominador pueden ser obtenidos de los datos notificados a la RENAVE.

- **Objetivo nacional:** Tendencia decreciente en la tasa de notificación de casos.